

## Начался сезон клещей



С наступлением тепла активизируются клещи – переносчики лихорадки. Геморрагическая лихорадка – это опасное инфекционное заболевание. Заразиться им можно при укусе клеща, при его раздавливании (при снятии их с животных и людей), при контакте с кровью больных. Возможна передача заболевания от человека к человеку.

- Инкубационный период этого заболевания составляет от 2 до 14 дней. Первыми признаками заболевания служат озноб, жар, повышение температуры тела до 39-41 градусов, сильная головная боль, боли в пояснице, суставах, мышцах, ломота во всем теле, тошнота, общая слабость. Лихорадочный период с высокой температурой 39-40 градусов может продолжаться до 12 дней. Возможно покраснение кожи, мелкие кровоизлияния, кровотечения.

Основные меры профилактики заболевания:

– ограничить пребывание на пастбищах, лугах, опушках лесов и лесопосадок;

– пребывая на природе, одеваться так, чтобы одежда плотно прилегала к телу, волосы покрывал головной убор, брюки желательно заправить в носки;

– одежду целесообразно обрабатывать специальными веществами, отпугивающими клещей, – репеллентами;

– каждые два часа и по возвращении с прогулки необходимо осматривать одежду;

- не допускать выпас скота в местах массового обитания грызунов и высокой активности клещей;
- регулярно проводить противоклещевые обработки животных;
- не допускать самовольный забой скота без ветеринарного освидетельствования;
- снимать клещей с животных только в перчатках, пинцетом или обращаться к ветеринарным специалистам; снятых клещей класть в емкость с керосином.

При обнаружении укуса или присосавшегося к телу клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение и наблюдаться в нем течение 14 дней. При этом дважды в день измерять температуру тела.